

数学一般: $\{A; P\} \setminus \text{set}\{\}\{\}, \cap \backslash \text{intersection}, \cup \backslash \text{union}, \bar{A} \backslash \text{complement}\{\}, N \backslash \mathbb{N}, N_0 \backslash \mathbb{N}_0, N_+ \backslash \mathbb{N}_+, Z \backslash \mathbb{Z}, Q \backslash \mathbb{Q}, R \backslash \mathbb{R}, C \backslash \mathbb{C}, \text{and } \text{\texttt{textand}}, \text{or } \text{\texttt{textor}}, \Rightarrow \backslash \text{lto}, \Leftarrow \backslash \text{lfrom}, \Leftrightarrow \backslash \text{iff}, \dots \dots \backslash \text{cdotss} \backslash \text{ldotss}, A \backslash \text{AA}$ (重打),
 $(a, b) \backslash \text{pair}\{\}\{\}, (a, b, c) \backslash \text{triplet}\{\}\{\}\{\}, (a, b, c, d) \backslash \text{quadruplet}\{\}\{\}\{\}\{\}, |A| \backslash \text{abs}\{\} \backslash \text{lowabs}\{\}, A^{-1} \backslash \text{inverse}, \sum \backslash \text{inlinesum}$, 複素平面 $\backslash \text{complexaxis}$
微分積分: $f(x) \backslash \text{int} \backslash \text{d} x, f(x) \backslash \text{int}^b_a \backslash \text{d} x, \int_a^b f(x) \backslash \text{d} x$

微分積分 : $\int \langle \text{dint} \langle \text{inlinedint}, J_a \langle \text{print} \rangle \rangle \langle \text{inlinedint} \rangle \rangle,$
 $[A]_a^b \langle \text{intbracket} \{a\} \{b\} \{A\}, \frac{\stackrel{a}{|} b \rightarrow c}{d \stackrel{|}{e} \rightarrow f} \langle \text{transformvariable} \{a\} \{b\} \{c\} \{d\} \{e\} \{f\},$
 $dx dy dz dr ds dt du d\vartheta \rangle \text{dx, const.} \langle \text{const}, \curvearrowright \text{neconcavearrow},$
 $\curvearrowleft \text{seconcavearrow}, \curvearrowup \text{seconvexarrow}, \curvearrowright \text{neconvexarrow}$

座標: $\text{Re } \text{\Re}, \text{Im } \text{\Im}, \overline{A} \text{\conjugate \lowconjugate}, (a, b) \text{\pcoord{\cdot}{\cdot}}$
 $\text{\planecoordinates{\cdot}{\cdot}}, (a, b, c) \text{\scoord{\cdot}{\cdot}{\cdot}} \text{\solidcoordinates{\cdot}{\cdot}{\cdot}},$
 $\vec{a} \text{\vec{\cdot}} \text{\lowvec{\cdot}}, (a, b) \text{\rvec{\cdot}{\cdot}}, (a, b, c) \text{\srvec{\cdot}{\cdot}{\cdot}},$

$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \cdot \cvec{\cdot}, \quad \begin{bmatrix} z \\ z \end{bmatrix} \cdot \scvec{\cdot}{\cdot}, \quad a \cdot b \cdot \inp{\cdot}{\cdot} \cdot \innerproduct{\cdot}{\cdot}$

離散 : $\{a_n\}$ \sequence{}, nPr \permutation{}{}, nCr \combination{}{},
 $n\Pi_r$, \repeatedpermutation{}{}, nH_r \homogeneous{}{}

幾何： $\circ \backslash degree$, $\widehat{AB} \backslash arc\{\} \overarc\{\}$, // $\backslash parallel$, $\approx \backslash similar$

Frac, Sqrt : \frac{1}{2}, \sqrt{2}, (-\sqrt{2},) \text{ originallim}

教科名： I \mathI, II \mathII, III \mathIII, A \mathA, B \mathB, C \mathC
余白：白紙 \whitepage, 全角 \zwspace, 半角 \halfzwspace, 縱余白 \vmargin,
縱大余白 \vmarginbox, 縱詰 \vnarrowspace, 縱大詰 \vnarrowbox,

數式：別單行 `equation*`, 複行揃 `align*`, 複業流 `gather*`, 間隔調整 `alignat`, 左右 align `aligned`, 式番号別 `cases`, `\$-\$` ラベル `\inlinelabel{}` `\textlabel{}`

リスト： clause-, (i) caseenumerate, (I) stepenumerate

引用：heading-, ① \equationref, 1 \questionref,

(1) \subquestionref, (i) \caseref, (I) \stepref, ((1)) \solutionref

問題番号 : heading-, (\-number{},) (1) \subquestionauto, \questionauto,
\solutionnauto, 10 \workbooknumber{10}, 番号初期化 \questionreset

強調：定義 \decdfn{}, 解答 \decans{} \decsentenceans{} (改行可),

本文 \em{}, A \marka{A}, B \markb{B}

下線：`\uline{}`, `\uuline{}`, `\uwave{}`, `\uuwave{}`, `\udash{}`, `\uudash{}`

テーマ： (空行挿入) テーマ \theme

後注： \annotation{}, \annotationhere

前置： °\elementary, * \advanced, * \super, † \ultra, * \level{3}

定理型環境： 定義 dfn, 定理 thm, 例説 illustration, 例題 example,

演習 exercise, 問題 question, 注意 remark, 定石 tactics, 予想 conjecture,
緒言 introduction, 史談 history, 閑話 talk

証明型環境： 例示 exempligratia, 証明 pf, 略証 summarypf, 着想 idea,

準備 preparation, 解答 answer, 略解 summaryanswer, 吟味 scrutiny,

理解 grasp, 補注 note, 研究 study, 余談 digression, 過誤 error, 悪手 poorness,
実験 experiment, Well-definedness welldefinedness

括弧： () \explanation{} \equationtext{} \parenttext{} \equationunit{},
「」 \ltextt{} \squaretext{}, 『』 \lltext{} \whitesquaretext{},

式中文： (与式) \lhs, (左辺) \rhs, (右辺) \given, (説明) \explanation{},
(式文) \equationtext{}, (根拠) \becausetext{}, (単位) \equationunit{},

「論理」 \ltextt{}, 『論理』 \lltext{}

講義記号： ~ \ellipsis, [] \think{}, [] \memorandum{},

◊ \order{}, → \cf, → \thinkto, → \similarquestion [] \whitebox

引用： → 著者『書名』出版社, pp.0–0 \inlinebook{4}, (↓ * URL 改行削除)

→ 著者「記事名」サイト名 (Accessed YYYY-MM-DD) URL \inlinewebsite{5},

→ 名前(原語), 生年–没年, 国 \inlinehuman{5}

pack： 行番号削除 [nolinenumbers], 試験 [exam], emath [emathPp] [emathPs]

解答切替： 解答 \begin{answerswitch} \begin{graphanswerswitch}

\inlineanswerswitch{}, 出典 \alignedsource{}}

ページ設定： タイトル \jphstitle,

A → TITLE / Q → 演習問題(演習) \jphsexercisetitle{TITLE},

(演習) on question \titlequestion, (解答) on answer \titleanswer,

answerfalse+sourcefalse+nolinenumbers \exercisemode

exam： タイトル, 日付, 時間の設定 \setexamtitle{}{}, \examtitle,

\examtitleleft, \examtitleright, \examtitlecalc, 得点 \exampoint{},

解答枠 \answersingle{}, \answerdouble{}, \answertriple{}

vertical (jlreq)： \papertitle, \theme, \subtheme, \em, \strong, \EOF